

ACRECIO

PROMOTOR DEL DESARROLLO RADICULAR

DE SANGOSSE
LATIN AMERICA



Distribuidor:




Ando
S. Ando y Cía. S.A.C.I.I.F.

Defensa 540 - C1065AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4342-4459 (Líneas rotativas) - Fax: (011) 4331-9162
Web site: www.andoycia.com.ar E-mail: info@andoycia.com.ar

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Concentración recomendada	Intervalos de aplicación
Tomate	10 L/ha	0,5 a 1%	Al trasplante o en plantas jóvenes cada 15 días.
Verduras de hoja			
Pepino			
Pimiento			
Arboles frutales	20 L/ha		A partir del hinchado de las yemas.
Vid			
Cítricos			Aplicar en períodos de picos radiculares.
Papa	5 L/ha		En siembra y a los 45 días en cobertura total.
Maíz, remolacha colza, trigo, girasol			En el surco al sembrar o después 15 L/ha, rociado sobre suelo.
Poroto	20 L/ha		3er hoja completamente desplegada (primera hoja trifoliada).
Arándanos y berries		3 aplicaciones durante los picos de crecimiento radicular.	
Frutilla		3 aplicaciones cada 15 días desde trasplante.	



RESULTADOS ENSAYO INTA LA CONSULTA - TOMATE INDUSTRIA, 2020.

Tratamientos	Producción Comercial Tn/Ha	Producción Total Tn/Ha	Tamaño de fruto Grs	Brix	Frutos Verdes (%)
Testigo	92,4	129,1	88	5,1	7,3
ACRECIO	98,8	133,4	76	5,0	6,8

Tratamientos	Frutos Sobremaduros (%)	Frutos Asoleados (%)	Frutos Descartes (%)	Podredumbre Apical Kgs/Ha
Testigo	13,7	4,2	5,2	424
ACRECIO	15,0	2,0	3,4	391



Testigo

ACRECIO
3 aplicaciones
x 10 L/ha.

Cultivo de frutilla otoñal.
Mar del Plata 2021.



Pimiento. Testigo,
vista de desarrollo radicular.

1er cosecha 2/8/21: (rojo)
52 cajones.
2da cosecha 18/8/21 (rojo)
26 cajones.

Corrientes



Pimiento. ACRECIO 500 cc/100 L,
aplicación en drench.

1er cosecha 2/8/21: (rojo)
60 cajones. (15,40 % arriba)
2da cosecha 18/8/21
30 cajones (15,40 % arriba).