

Fantic M

WG

FUNGUICIDA

CULTIVO: TOMATE

ENFERMEDAD: Tizón Tardío (*Phytophthora infestans*)

DOSIS: 2,5 Kg/Ha

OBSERVACIONES: Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días, con un máximo de 4 aplicaciones/campaña. Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.



CULTIVO: VID

ENFERMEDAD: Peronospora (*Plasmopara viticola*)

DOSIS: 2,5 Kg/Ha

OBSERVACIONES: Los tratamientos deben iniciarse cuando las condiciones sean predisponentes. En variedades sensibles se aconseja aplicar preventivamente en pre y post-floración hasta el cierre de racimos. No se deben realizar más de 4 aplicaciones sobre el mismo viñedo por campaña. Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días.



CULTIVO: PAPA

ENFERMEDAD: Tizón Tardío (*Phytophthora infestans*)

DOSIS: 2,5 - 3,0 Kg/Ha

OBSERVACIONES: Para proteger el cultivo se recomiendan pulverizaciones preventivas cada 10 días. Iniciar los tratamientos cuando las condiciones ambientales sean favorables al desarrollo de *Phytophthora*. En condiciones muy predisponentes reducir el intervalo a 7 días.



CULTIVO: CEBOLLA

ENFERMEDAD: Peronospora (*Peronospora destructor*)

DOSIS: 2,5 Kg/Ha

OBSERVACIONES: Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días, con un máximo de 4 aplicaciones/campaña. Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.



S. Ando & Cia. S.A.

Defensa 540 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1065AAJ) - Argentina
Tel: +54 - 11 4342 - 4459 (Líneas rotativas) - Fax: +54 - 11 4331 - 9162

www.andoycia.com.ar

FANTIC M[®] WG es un fungicida sistémico y de contacto que actúa en forma preventiva y curativa, combina la acción sistémica del BENALAXYL M (Fenilamida) con la acción preventiva del MANCOZEB dando como resultado un amplio espectro de control y una prolongada protección a la planta.

MODO DE ACCIÓN:

El **BENALAXYL M** actúa inhibiendo el avance de la enfermedad dentro de la planta e incluso afectando la germinación de las esporas.

El **MANCOZEB** proporciona una excelente protección al exterior de la planta.

¡MAYOR PROTECCIÓN!

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

BENALAXYL M: 4 %

MANCOZEB: 65 %

INERTES Y COADYUVANTES c.s.p.: 100 %



Mancozeb - MAYOR PROTECCIÓN
Acción de contacto contra las zoosporas.

Benalaxyl M - ACCIÓN DE CONTACTO EFECTO ADICIONAL
Perturbación de la membrana celular del hongo
Inhibición de la Germinación de las zoosporas.

GENERALIDADES:

FANTIC M es un fungicida que actúa en forma sistémica y por contacto. De acción preventiva y curativa. Actúa sobre el metabolismo de la pared celular de hongos, interfiriendo en su síntesis, inhibe la acción de la ARN polimerasa, interfiere en la formación de las esporas y bloquea el crecimiento del micelio en el interior de la planta huésped. **FANTIC M** se moviliza en la planta de forma acrópeta. No interfiere en el metabolismo y la fisiología de los vegetales.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad recomendada de producto, manteniendo en todo momento el sistema de agitación. Agregar agua hasta completar las $\frac{3}{4}$ partes del tanque. Agregar aditivos si se desea y completar el tanque con agua manteniendo la agitación constante.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto puede ser aplicado tanto con equipos de alto como bajo volumen. En el caso de cultivos de papa, es conveniente que el mismo arroje un caudal mayor a 400L/Ha y que esté provisto de un agitador de tanque. En vid debe ser aplicado con pulverizadores que tengan una uniforme distribución sobre el cultivo y que arrojen un caudal de 1000L/Ha. En caso de ser necesario pueden realizarse aplicaciones aéreas con un caudal mayor a 20L/Ha y viento no superior a 10Km/h. La pulverización deberá garantizar una distribución uniforme del producto sobre toda la superficie foliar del cultivo alcanzando una cobertura de 50-70 gotas por cm².

RESTRICCIONES DE USO:

Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir un intervalo mínimo de 7 días en los cultivos de tomate y cebolla. En papa 14 días y en vid 21 días.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24hs después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa al tratamiento.

FITOTOXICIDAD:

No fitotóxico en las dosis y momentos de aplicación recomendados.

FANTIC M es un producto de **ISAGRO** distribuido por **S. Ando y Cía S.A.**